

تأثیر آلودگی هوا بر غلظت فلزات سنگین (آهن، مس، روی و منگنز) در برگ درختان افرای زیستی و چنار (مطالعه موردنی: شهرستان ارومیه)

گیتا رحمانی^۱، نسرین سیدی^{۱*}، عباس بانج‌شفیعی^۱ و میرحسن رسولی صدقیانی^۲

(تاریخ دریافت: ۹۶/۴/۵؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۲/۱۵)

چکیده

فلزات سنگین از مهم‌ترین آلاینده‌های محیطی به شمار می‌آیند. آلودگی محیط به این مواد در نتیجه فعالیت‌های صنعتی و کاربرد سmom و غیره حاصل می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آلودگی شهری بر میزان غلظت فلزات سنگین (آهن، مس، روی و منگنز) برگ درختان فضای سبز شهری ارومیه است تا مقاومت گونه‌های مورد مطالعه ارزیابی شود. بدین منظور در مرداد ۹۲ و اردیبهشت ۹۳، نمونه‌های برگ درختان افرای زیستی و چنار از پنج منطقه با درجه آلودگی متفاوت جمع‌آوری و میزان غلظت فلزات سنگین آنها اندازه‌گیری شد. با توجه به افزایش آلودگی در سال دوم نسبت به سال اول، انباشت اغلب عناصر توسط گونه‌های مورد نظر نیز افزایش یافته بود. درنهایت، گونه چنار نسبت به گونه افرای زیستی عناصر را از آستانه مجاز تعریف شده بیشتر انباشت کرده بود و به عنوان گونه مقاوم‌تری معرفی شد. همچنین گونه‌های مورد بررسی میزان انباشت عناصرشان در منطقه شاهد کمتر و در مناطق آلوده بیشتر بود بنابراین از این گونه‌ها می‌توان در تکیک مناطق آلوده و غیرآلوده نیز استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: آلاینده، عناصر برگ، فضای سبز شهری، گیاه‌پالایی

۱. گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

۲. گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: n.seyedi@urmia.ac.ir

مقدمه

یابد (۳۴). گیاه عناصر پر مصرف مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم، سدیم و ...، و عناصر کم مصرف مورد نیاز خود مانند آهن، منگنز، مس، روی، سرب و ... را یا از طریق ریشه خود از خاک می‌گیرد و یا از طریق روزنه‌های هوایی خود از هوا دریافت می‌کند. این عناصر برای گیاهان به اندازه حد کفایت مورد نیاز بوده و بیشتر از این حد برای گیاهان سمی است (۸). از طرفی آلوگی هوا میزان این عناصر را تحت تأثیر قرار داده و در گیاهانی که حد کفایت جذب عناصر بالا باشد قابلیت جذب بسیاری از این عناصر و همچنین عناصر سنگین حاصل از آلوگی در آنها بالا بوده و به مراتب مقاومت‌شان در برابر عناصر آلینده بالاست. این گونه‌ها را، که آلوگی هوا، خاک و آب را جذب می‌کنند و در تمایز هوای آلوه و غیرآلوه به کار گرفته می‌شوند، گونه‌های ردیاب زیستی (Bioindicator) می‌نامند (۲۱ و ۳۱). بسیاری از گیاهان قادرند تعدادی از آلینده‌ها را از طریق اندام‌های هوایی خود به خصوص برگ‌ها جذب و در خود ذخیره کنند، از این‌رو شناسایی این گونه‌ها و استفاده از آنها در قالب گیاه‌پالایی روش مناسبی برای مبارزه با آلوگی است. گیاه‌پالایی (Phytoremediation) یک تکنیک پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجزیه، تجمع و یا تصحیح آلینده‌ها و عناصر سنگین با کمک گیاهان و زدودن آلوگی‌های هوا، آب و خاک است (۲۳ و ۳۳). این تکنیک قابلیت به کارگیری در سطح وسیعی داشته و دارای ارزش اکولوژیکی است (۱۴). در این میان جنگلهای شهری نقش عمده‌ای در جلوگیری از انتشار و کاهش دی‌اکسید کربن جوی دارند و انتخاب گیاه در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۱۳). لاوال و همکاران (۲۴) گونه *Azadirachta indica* را به دلیل توانایی بالا در جذب عناصر سنگین حاصل از آلوگی، به عنوان گونه مقاوم در برابر آلوگی در منطقه‌ای از نیجریه معروفی کردند. پیکرزاک و همکاران (۲۹) با تحقیقی روی مقدار انباشت روی در برگ‌های درختان موجود در فضای شهری پایتحت لهستان، نشان دادند که گونه بید ۱۲۲ تا ۳۵۶ میلی‌گرم در کیلوگرم و گونه افرا ۳۷/۵ تا ۵۶/۱ میلی‌گرم در کیلوگرم

آلوگی هوا یکی از مشکلات اساسی در کلان‌شهرهای ها بوده و کیفیت هوای شهر تحت تأثیر خروج گازهای آلینده از منابع متحرک و ثابت قرار گرفته که باعث تأثیر منفی بر سلامت انسان، حیوانات و گیاهان می‌شود (۳، ۷ و ۱۲). تحقیقات نشان داده است که حمل و نقل مهم‌ترین منبع آلوگی با منشا انسانی است (۲۸). دود حاصل از حمل و نقل جاده‌ای، خطوط راه‌آهن، حمل و نقل هوایی و آبی منتشر شده و به طور عمده در تشکیل بارش اسیدی مؤثر بوده و علاوه بر این باعث تحلیل لایه ازون استراتوسفر شده که این عامل در تغییرات اقلیمی مؤثر است. ترافیک شهری بیشترین تأثیر را در آلوگی هوا دارد که باید راهکارهایی را برای کاهش آلوگی ارائه کرد (۱۷). منابع آلوگی باعث انتشار آلینده‌های محیطی می‌شوند که از شایع ترین آلینده‌های محیطی می‌توان به مونوکسید کربن (CO)، دی‌اکسید نیتروژن (NO₂، دی‌اکسید گوگرد (SO₂، اوزون (O₃) و (PM₁₀) ذرات معلق در هوا و یا ذرات ریزتر از ۱۰ میکرون (PM_{2.5}) اشاره کرد (۳۰). فلزات سنگین نیز از مهم‌ترین آلینده‌های محیطی به شمار می‌آیند که در بین این فلزات می‌توان به سرب، کادمیوم، آهن، مس، روی، نیکل، کبات، جیوه و نقره اشاره کرد، آلوگی محیط به این مواد در نتیجه فعالیت‌های صنعتی و کاربرد سموم و... حاصل می‌شود (۲۵). آلینده‌ها یا به طور مستقیم از طریق تنفس و یا به طور غیرمستقیم از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان می‌شوند و باعث اختلالات تنفسی و مشکلات عصبی شده و احتمال سرطان‌زایی را افزایش می‌دهند (۲۷). گیاهان به دلیل عدم تحرک به طور کامل در معرض آلوگی قرار می‌گیرند. لذا ضریب پذیری آنها در برابر آلینده‌ها و سایر تنش‌های محیطی بیشتر از سایر موجودات زنده است (۲۲). به عنوان مثال آلینده‌ها باعث کاهش فتوستتر، کاهش رشد ریشه‌ها، کاهش رنگیزه‌های گیاهی، کاهش تعداد روزنه‌ها در سطح رویی و زیری برگ و کاهش تعدادی از صفات جوانهزنی می‌شوند (۴ و ۵). همچنین میزان قندهای محلول و کربوهیدرات‌ها در مناطق آلوه به مقدار قابل توجه کاهش می‌

می شود تا گونه مقاوم تر به آلودگی، جهت کاشت بیشتر در فضای سبز شهری و مناطق آلوده شهر معرفی شود.

مواد و روش ها

موقعیت و محل اجرای پژوهش

ابتدا به منظور انتخاب مناطق مناسب برای نمونه برداری اقدام به بررسی میدانی پارک ها و فضاهای سبز واقع در شهر ارومیه شد. سپس با توجه به داشتن فاصله با مراکز آلوده کننده هوا نظر پایانه های مسافربری، میدان های پر ترافیک، مناطق پر جمعیت شهری و همچنین سنجش با دستگاه سنجنده سیار آلودگی هوا اقدام به انتخاب پنج منطقه از آلوده ترین تا پاک ترین منطقه به ترتیب زیر شد:

- ۱- پارک کوثر با بالاترین شدت آلودگی هوا (واقع در نزدیکی پایانه شهری)
- ۲- پارک حجاب با شدت آلودگی کمتر از منطقه ۱ (واقع در فلکه مدرس)
- ۳- پارک ائللر باغی با شدت آلودگی کمتر از منطقه ۲ (واقع والفجر)
- ۴- پارک الغدیر با شدت آلودگی کمتر از منطقه ۳ (واقع در بلوار امامت)
- ۵- پردیس شهری دانشگاه ارومیه با کمترین شدت آلودگی به عنوان منطقه شاهد (واقع در خیابان شهید بهشتی) سنجش آلاینده های هوا شامل گازهای اوزون، آمونیاک، دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و ذرات معلق در هر پنج منطقه با استفاده از دستگاه های سنجنده سیار (دستگاه پرتاب مدل LSI برای اندازه گیری گازهای آلاینده و دستگاه پرتابل مدل TSI برای اندازه گیری ذرات معلق) در پنج نقطه به صورت تصادفی و با سه تکرار انجام شد.

زمان، روش نمونه برداری، آماده سازی و تجزیه گیاه نمونه برداری به روش انتخابی انجام شد. به طوری که در هر

روی در طول سال از هوا در برگ های خود انباسته می کنند. در مطالعه ای دیگر، غلظت سرب در برگ گیاهان اقلایی و خرزه ره واقع در منطقه صنعتی قازیانتپ ترکیه ۲۰۰۰ برابر بیشتر از نواحی شاهد بود (۲۰). شبستان و چراغی (۶) در بررسی زیست پالایی فلزات سنگین توسط گونه های چوبی مورد استفاده در جنگلداری شهری سندنج، گزارش کردند که انباسته سرب، روی و کادمیوم در برگ بیشتر گونه ها در منطقه آلوده به طور معنی داری بیشتر از منطقه شاهد بود.

با توجه به نگرانی های اخیری که در رابطه با آلودگی هوا مطرح است توجه و چاره اندیشی نیز باید در ایران مدنظر باشد. به عنوان مثال، عطا آبادی و همکاران (۹) تأثیر آلودگی هوا بر گونه های *Cupressus arizonica* و *Quercus brantii Pinus eldarica* در شهر اصفهان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در مناطق آلوده این شهر میزان جذب عناصر آهن، مس، نیکل و سرب توسط گونه *Cupressus arizonica* بیشتر از دو گونه دیگر بوده و این گونه ظرفیت و مقاومت بالایی در برابر آلاینده ها دارد و می توان آن را در سطح شهر اصفهان برای پالایش آلاینده ها به کار برد. از آنجا که این گونه توانسته است عناصر سنگین را در برگ های خود ذخیره کند برای پالایش های آلوده می تواند مناسب باشد. در این میان شهر ارومیه نیز از کلان شهرهای ایران به شمار می آید، ولی تاکنون تحقیقی در رابطه با مبارزه با آلودگی در این شهر در دسترس نیست. این شهر با مساحت ۱۰ هزار و ۵۴۸ هکتار در شمال غربی کشور واقع شده است و گونه های چنار و افرا زیستی در سطح شهر ارومیه در پارک ها زیاد به چشم می خورند. چنار شاخه های بلند و برگ های زیادی دارد این ویژگی ها باعث شده که از این گونه در اطراف معابر و ایجاد سایه در پارک ها استفاده شود. برگ های پهن چنار این توانایی را دارند که دی اکسید کربن بیشتری را جذب و با انجام فتوستز اکسیژن بیشتری را تولید کنند. افزای زیستی نیز دارای شاخه های بلند است و گونه ای پر کاربرد است (۱۱). در این تحقیق تأثیر آلودگی هوا بر انباسته عناصر سنگین آهن، مس، روی، منگنز در برگ گونه های اشاره شده، بررسی

جدول ۱. میزان آلاینده‌های اندازه‌گیری شده در مرداد ۹۲ و اردیبهشت ۹۳ در مکان‌های مورد مطالعه

آلاینده‌ها										مناطق مورد مطالعه
CO (ppm)	SO ₂ (ppm)		PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		NH ₃ (ppm)		O ₃ (ppm)			
۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	مناطق مورد مطالعه
۶/۰a	۷/۹a	۰/۳a	۰/۳a	۷۰/۸a	۵۸a	۲/۸a	۲/۳a	۰/۱۳a	۰/۰۹a	کوثر
۵/۵a	۷/۵a	۰/۳a	۰/۳a	۶۶/۶a	۴۶ab	۲/۶a	۲/۳a	۰/۱۲a	۰/۰۸a	حجاب
۲/۸c	-	۰/۴a	۰/۳a	۳۴/۶b	۴۵/۳ab	۲/۶a	۲/۳a	۰/۰۹ b	۰/۰۷a	اثللرباغی
۲/۹b	۶/۳b	۰/۴a	۰/۳a	۶۳a	۳۴/۶b	۲/۷a	۲/۴a	۰/۱۱ab	۰/۰۸a	الغدیر
۲/۰c	۱/۵c	۰/۳a	۰/۳a	۲۲b	۲۵/۳b	۲/۶a	۲/۹b	۰/۰۸a	۰/۰۷a	پرديس شهر

در هر سنتون ميانگين‌های با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ هستند.

پارک ۵ درخت با صفات حتی‌الامکان هم‌سن، سالم، دارای تاج متقارن و بدون آفت از هر گونه (چنار و افرا زیستی) انتخاب شدند. در دو نوبت، اواخر مرداد ۱۳۹۲ و اردیبهشت ۱۳۹۳ (در اوخر و اوایل فصل رویش)، نمونه‌های برگ از هر پایه در سه مقطع ارتفاعی و چهار جهت اصلی برداشت شدند. به‌منظور آماده کردن نمونه‌ها برای اندازه‌گیری غلظت عناصر برگ از روش هضم به روش سوزاندن خشک و ترکیب با HCl استفاده شد (۱۶). ۱۰ عدد برگ از هر پایه از بین ۳۰ برگ به‌طور تصادفی انتخاب و پس از شستشو با آب مقطر، به‌مدت ۴۸ ساعت در آون ۷۰ درجه خشک شدند (۶). سپس برگ‌های خشک، آسیاب شده و نمونه‌ها کاملاً یکنواخت شدند. در مرحله بعد برگ‌های آسیاب شده از الک ۰/۵ میلی‌متری عبور داده شده و سپس ۱ گرم از برگ آسیاب شده با دقت ۰/۰۰۱ گرم توزین و در کروزه چینی ریخته و در کوره با حرارت معمولی قرار گرفتند. دمای کوره به تدریج و در عرض ۲ ساعت به ۵۵۰ درجه رسیده و نمونه‌ها ۴ تا ۱۲ ساعت در این حرارت نگهداری شدند. در مرحله بعد از خاکستر به‌دست آمده با افزودن ۱۰ میلی‌لیتر HCl عصاره تهیه شد و میزان تمام عناصر با استفاده از این عصاره توسط دستگاه جذب اتمی اسپکترومتری (Shimadzu 6300 AA) خوانده شدند.

نتایج

نتایج سنجش آلاینده‌ها با سنجنده‌های پرتاپل و ثابت در جدول ۱ نشان داده شده است. بر طبق این نتایج، میزان آلاینده‌های ازون، آمونیاک، مونوکسیدکربن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق اندازه‌گیری شده در مرداد ۹۲ در پارک کوثر (منطقه‌ای با بیشترین میزان آلودگی) حداقل و در پرديس شهر (منطقه‌ای با کمترین میزان آلودگی) حداقل بود. میزان ازون در مکان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار نداشت. حد استاندارد ازون ۰/۰۵ ppm (میلی‌گرم در مترمکعب) است که در کل پارک‌های مورد مطالعه بیشتر از این مقدار بود. میانگین آمونیاک در مناطق مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار نشان داد. اختلاف میانگین ذرات معلق اندازه‌گیری شده در مکان‌های متفاوت از نظر آلودگی در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار بود، حد استاندارد این آلاینده ۵۰ میکروگرم در مترمکعب است که در پارک کوثر بیشتر از این میزان مشاهده شد. مونوکسیدکربن در اثللرباغی به‌دلیل خرابی دستگاه اندازه

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه آماری داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار

بیشترین میزان غلظت میانگین آهن نیز در هر دو دوره در پارک کوثر مشاهده شد و اختلاف آن با سایر مناطق (به جز پارک ائلریاغی در اردیبهشت ۹۳) معنی دار بود. میانگین غلظت آهن برگ افرای زیستی در اردیبهشت ۹۳ نسبت به مرداد ۹۲ در پارک های حجاب، کوثر، ائلریاغی و الغدیر افزایش یافته است که این افزایش فقط در پارک حجاب معنی دار بود. همچنین کاهش میزان غلظت آهن در پرديس شهر نیز در اردیبهشت ۹۳ نسبت به مرداد ۹۲ معنی دار نبود. میزان غلظت روی در مرداد ۹۲ بین مناطق مختلف تفاوت معنی دار نشان نداد در حالی که در اردیبهشت ۹۳ میزان غلظت روی در پارک کوثر بیشترین مقدار بود و با پارک حجاب و پریس شهر اختلاف معنی داری داشت. همچنین میانگین غلظت روی در اردیبهشت ۹۳ نسبت به مرداد ۹۲ در پارک های حجاب، کوثر، ائلریاغی و الغدیر افزایش و در پرديس شهر کاهش یافته است که این تغییرات در کل مناطق مورد مطالعه در سطح ۰/۰۵ معنی دار بود. میزان غلظت منگنز نیز در مرداد ۹۲ در مناطق مختلف تقریباً یکسان بود (به جز در پرديس شهر که کمترین مقدار را داشت) ولی در اردیبهشت ۹۳ به ترتیب در پارک حجاب و کوثر بیشترین مقدار را داشت که با سایر مناطق اختلاف معنی دار مشاهده شد. میانگین غلظت منگنز در پارک های حجاب، کوثر، در اردیبهشت ۹۳ افزایش و همان‌طور که ملاحظه می‌شود در پرديس شهر، ائلریاغی و الغدیر کاهش یافته است ولی این تغییرات در هیچ‌کدام از مناطق مورد مطالعه معنی دار نبود (شکل ۱).


نتایج تجزیه برگ چnar

مطابق شکل ۲، بیشترین میزان غلظت مس در مرداد ۹۲، در آلوده‌ترین منطقه (پارک کوثر) مشاهده شد که با سایر مناطق اختلاف معنی داری نشان داد. ولی در اردیبهشت ۹۳ بیشترین میزان غلظت مس به ترتیب به پارک های حجاب و الغدیر تعلق داشت که با مناطق دیگر اختلاف معنی دار داشتند. میانگین غلظت مس در اردیبهشت ۹۳ در پارک ائلریاغی مشاهده شد که با سایر مناطق اختلاف معنی دار داشت. مقدار غلظت مس در پارک کوثر در اردیبهشت ۹۳ نسبت به مرداد ۹۲ به طور معنی داری (در سطح ۰/۰۵) کاهش یافته است. ولی افزایش غلظت مس در اردیبهشت ۹۳ در مکان‌های دیگر، به جز پارک ائلریاغی، معنی دار نبود.

گیری نشد. حد استاندارد دی‌اکسید گوگرد ppm ۰/۱ است که در کل پارک‌های مورد مطالعه بیشتر از این میزان بود. براساس نتایج سنجش آلاینده‌ها در اردیبهشت ۹۳، میزان آلاینده‌های ازون، آمونیاک، مونوکسیدکربن و ذرات معلق اندازه‌گیری شده در پارک کوثر (منطقه‌ای با بیشترین میزان آلودگی) حداًکثر و در پرديس شهر (منطقه‌ای با کمترین میزان آلودگی) حداقل بود. بیشترین میزان دی‌اکسید گوگرد در ائلریاغی و الغدیر مشاهده شد. بین میانگین ازون اندازه‌گیری شده در مکان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود داشت، و میزان این آلاینده در کل پارک‌های مورد مطالعه بیشتر از حد استاندارد بود. بین میانگین آمونیاک و دی‌اکسید گوگرد در مناطق مورد مطالعه اختلاف معنی دار مشاهده نشد و میزان دی‌اکسید گوگرد نیز در کل پارک‌های مورد مطالعه بیشتر از حد استاندارد بود. بین میانگین مونوکسیدکربن اندازه‌گیری شده در مکان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی دار مشاهده شد. حد استاندارد مونوکسیدکربن ppm ۹ است که در کلیه پارک‌های مورد مطالعه کمتر از این مقدار بود. همچنین میانگین ذرات معلق اندازه‌گیری شده در مکان‌های متفاوت نیز دارای اختلاف معنی دار بودند، حد استاندارد این آلاینده ۵۰ میکروگرم در مترمکعب است که به جز پرديس شهر و ائلریاغی در بقیه پارک‌ها بیشتر از این میزان مشاهده شد. شایان ذکر است که آمونیاک جزء آلاینده‌های اصلی نبوده و میزان استاندارد آن تعریف نشده است.


نتایج تجزیه برگ افرای زیستی

مطابق شکل ۱، میانگین غلظت مس در آلوده‌ترین منطقه (پارک کوثر) بیشترین مقدار را در مرداد ۹۲ نسبت به سایر مناطق داشت و این اختلاف معنی دار بود. بیشترین میزان غلظت مس در اردیبهشت ۹۳ در پارک ائلریاغی مشاهده شد که با سایر مناطق اختلاف معنی دار داشت. مقدار غلظت مس در پارک کوثر در اردیبهشت ۹۳ نسبت به مرداد ۹۲ به طور معنی داری (در سطح ۰/۰۵) کاهش یافته است. ولی افزایش غلظت مس در اردیبهشت ۹۳ در مکان‌های دیگر، به جز پارک ائلریاغی، معنی دار نبود.



شکل ۱. غلظت فلزات سنگین (الف: مس، ب: آهن، ج: روی، د: منگنز) برگ افرای زیستی در دو دوره نمونهبرداری از مکان‌های مورد مطالعه (در هر دوره زمانی میانگین‌های با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ هستند)

تاثیر آلودگی هوا بر غلظت فلزات سنگین (آهن، مس، روی و منگنز) در...



شکل ۲. غلظت فلزات سنگین (الف: مس، ب: آهن، ج: روی، د: منگنز) برگ چنار در دو دوره نمونه برداری از مکان‌های مورد مطالعه (در هر دوره زمانی میانگین‌های با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ هستند)

میکروگرم در گرم (۲۰٪ تا ۵۰٪ میلی گرم در گرم) تجاوز کند گیاه تحت تأثیر سمیت قرار می‌گیرد (۸). برای فلز مس نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در برگ گونه‌های افرا و چنار در مکان‌های مورد مطالعه به ترتیب بین ۱۳٪ تا ۵۸٪ و ۱٪ تا ۴۴٪ میلی گرم در گرم متغیر بوده است. هر دو گونه عنصر مس را بیشتر از حد مجاز در برگ‌های خود ذخیره کرده‌اند. البته در مناطق آلوده میزان ذخیره مس توسط برگ افرا بیشتر بود. زیرا طبق تحقیقات انجام شده، در مناطق آلوده و پرترافیک، میزان مس به‌دلیل اکسیداسیون روغن، سائیدگی لاستیک و لنت ترمز اتومبیل‌ها بیشتر است (۱۵ و ۱۸). همچنین مشخص شد که مس توسط گردوبغار جابه‌جا شده و باعث آلودگی گیاهان مناطق مورد نظر شده است. آهن یکی از عناصر ضروری کم مصرف گیاهان است که گیاهان بدون وجود آن قادر به تکمیل چرخه حیاتی خود نیستند. اما وجود همین عنصر در مقادیر بالاتر از حد مجاز برای گیاهان سمی است. حد کفایت این عنصر برای بیشتر گیاهان ۵۰-۵۰۰ میکروگرم در گرم ۵٪ تا ۵٪ میلی گرم در گرم) و حد بحرانی آن ۵٪ میکروگرم در گرم برای بیشتر گیاهان گزارش شده است (۸). در این مطالعه فلز آهن نیز در گونه افرای زیستی (۲۰٪ تا ۵٪ میلی گرم در گرم) و چنار (۰٪ تا ۵٪ میلی گرم در گرم) بیشتر از حد کفایت بود. میانگین آهن ذخیره شده در گونه چنار بیشتر از حد مجاز گزارش شده توسط عبادی و هنرجو (۸) بود. روی نیز یکی از عناصر کم مصرف ضروری برای گیاهان است. حد مجاز روی در بافت‌های گیاهی ۱۰-۲۰ میکروگرم در گرم (۰٪ تا ۱٪ میلی گرم در گرم) است (۱۹). در گونه افرا غلظت روی بین ۱٪ تا ۸٪ میلی گرم در گرم و در گونه چنار بین ۱٪ تا ۶٪ میلی گرم (در گرم در مکان‌های مورد مطالعه) متغیر بوده که در هر دو گونه در حد مجاز است. منگنز نیز از عناصر ضروری برای گیاهان بوده و حد مجاز این عنصر در بافت‌های گیاهی ۳٪ تا ۳۰٪ میکروگرم در گرم (۲٪ تا ۳٪ میلی گرم در گرم) است (۸). غلظت منگنز در گونه افرا و چنار کمتر از حد مجاز و به ترتیب بین ۲٪ تا ۶٪ میلی گرم در

معنی‌دار ولی در پارک‌های دیگر اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. میانگین غلظت آهن در هر دو دوره در پارک کوثر به صورت معنی‌داری بیشتر از سایر مناطق بود. مقایسه میانگین غلظت آهن برگ چنار در دو دوره نمونه‌برداری نشان داد که میانگین غلظت آهن در اردیبهشت ۹۳ در پارک‌های حجاب، کوثر، ائلریاغی و الغدیر افزایش و در پردیس شهر کاوش یافته است و این اختلاف فقط در پارک کوثر از نظر آماری معنی‌دار بود. میزان غلظت روی در مرداد ۹۲ بین مناطق مختلف تفاوت معنی‌دار نشان نداد در حالی که در اردیبهشت ۹۳ میزان غلظت روی به ترتیب در پارک کوثر و حجاب بیشترین مقدار بود و با سایر مناطق اختلاف معنی‌داری داشت. میانگین غلظت این عنصر در پارک‌های حجاب، کوثر و ائلریاغی در اردیبهشت ۹۳ بیشتر و در پارک الغدیر و پردیس شهر کمتر از مرداد ۹۲ بود. این تفاوت‌ها در دو دوره نمونه‌برداری در تمام مناطق مورد مطالعه به‌جز الغدیر در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود. میزان غلظت منگنز در مرداد ۹۲ به ترتیب در پارک‌های کوثر و حجاب بیشترین مقدار بود که با مناطق دیگر تفاوت معنی‌دار نشان داد در حالی که در اردیبهشت ۹۳ بیشترین مقدار در پارک ائلریاغی مشاهده شد که با سایر مناطق اختلاف معنی‌دار داشت. درنهایت میانگین غلظت منگنز در اردیبهشت ۹۳ در کلیه پارک‌های مورد مطالعه به‌جز ائلریاغی کاوش یافته که این کاوش از نظر آماری معنی‌دار نبوده است ولی در پارک ائلریاغی نسبت به مرداد ۹۲ افزایش معنی‌دار یافته است (شکل ۲).

بحث و نتیجه‌گیری

توانایی انباست فلزات سنگین در گونه‌های گیاهی مختلف می‌تواند متفاوت باشد، که این پذیده به احتمال زیاد به صفات فیزیولوژیک گونه‌ها مربوط است، همچنین رفتار یک گونه در میزان انباست فلزات مختلف نیز متفاوت است (۶). عنصر مس در زمرة عناصر ضروری کم مصرف برای گیاهان است. حد مجاز آن در بافت‌های گیاهی ۵-۳۰ میکروگرم در گرم است. هرگاه غلظت مس در بافت‌های گیاهی از گستره ۲۰-۳۰٪

غلظت عنصر مس در گونه افرای زیستی بیشتر از گونه چنار مشاهده شد. ولی غلظت عناصر آهن، روی و منگنز در گونه چنار بیش از افرا بود. که می تواند به دلیل اندازه برگ گونه چنار نسبت به افرای زیستی باشد زیرا سطح برگ‌ها در نگهداری فلزات سنگین مؤثر است (۲). غلظت فلزات سنگین مس و آهن در گونه‌های افرای زیستی و چنار بیشتر از حدکفاایت بوده و این بدین معنی است که این گونه‌ها از نظر بیوشیمیایی مقاوم به آلودگی هستند. ولی باید این نکته را مدنظر قرار داد اگرچه چنار پایه مقاومی است ولی در سطح برگ این گونه گردخاک زیادی جذب شده که خود باعث آلودگی هوا می شود. البته باید خاطرنشان شد علاوه بر اینکه عناصر از طریق هوا وارد برگ‌ها می شوند عناصر موجود در خاک هم میزان عناصر برگ را تحت تأثیر قرار می دهند و باید این عامل نیز مدنظر قرار گیرد. آلاینده‌های هوا به وسیله باران یا تهنشین شدن وارد خاک شده و گیاه آن را از طریق آب، خاک و هوا جذب خواهد کرد. در این بررسی با توجه به اینکه پوشش گیاهی کلیه مناطق مورد مطالعه دست کاشت بوده و اصولاً خاک این مناطق یکسان است می توان عامل هوا را بین مناطق مختلف متفاوت دانست. به طور کلی گونه‌های چنار و افرای زیستی در مناطق آلوده نسبت به مناطق غیرآلوده فلزات سنگین را بیشتر ذخیره کرده‌اند در نتیجه این گونه‌ها توانایی تفکیک مناطق آلوده و غیرآلوده شهر ارومیه را دارا هستند و می توان از این دو گونه به عنوان ردیاب زیستی استفاده کرد.

نتیجه گیری کلی

این مطالعه نشان داد که درخت چنار نسبت به گونه افرای زیستی پتانسیل انباشت مقادیر بیشتری از فلزات سنگین را در برگ خود داراست و در شرایط کیفیت هوای آلوده نیز مقاومت خوبی از خود نشان می دهد. از آنجایی که میزان انباشت فلزات سنگین گیاهان مورد مطالعه در مناطق شاهد کمتر و در مناطق آلوده‌تر بیشتر بود لذا با بررسی میزان انباشت این عناصر در برگ این درختان می توان مناطق آلوده را از مناطق غیرآلوده تفکیک نمود.

گرم و ۰/۱۰ تا ۰/۰ میلی گرم در گرم متغیر بود. منگنز در هوا نیز از لنت ترمز منشا گرفته (۱۵) بنابراین می توان نتیجه گرفت که در مناطق پرترافیک و آلوده میزان غلظت این عنصر بیشتر است. نتایج تحقیق حاضر نیز غلظت بالای منگنز را در مناطق با آلودگی بیشتر نشان داد و تغییرات این عنصر بین مکان‌های متفاوت از نظر آلودگی در سطح ۰/۰۵ معنی دار بود. ساودیس و کریستالیدیس (۳۲)، نیز غلظت بالای عناصر سنگین را در گیاهان با افزایش آلاینده‌ها در مناطق شهری گزارش کردند. در پژوهش حاضر، غلظت عنصر مس در مرداد ۹۲ در هر دو گونه در آلوده‌ترین منطقه تفاوت معنی داری با سایر مناطق داشت در حالی که این عنصر در اردیبهشت ۹۳ آلوده‌ترین منطقه را از بقیه مناطق تفکیک نکرد. غلظت عنصر آهن در هر دو گونه و در هر دو زمان نمونه‌برداری، منطقه آلوده را از سایر مناطق تفکیک کرد. آلوده‌ترین منطقه در هیچ یک از گونه‌ها در دو زمان براساس غلظت عنصر روی از سایر مناطق تفکیک نشد. غلظت منگنز در گونه افرا در هر دو زمان در آلوده‌ترین منطقه با سایر مناطق تفاوت معنی دار داشت در حالی که غلظت این عنصر برای گونه چنار فقط در مرداد ۹۲ براساس درجه آلودگی متفاوت بود. عظمپور و همکاران (۱۰)، در تحقیق مشابه که در کرمانشاه بر گونه‌های زیان‌گنجشک، نارون چتری و بید سفید در سه دوره اردیبهشت، مرداد و مهر انجام دادند عنوان کردند که بین غلظت عناصر در زمان‌های متفاوت آماربرداری اختلاف معنی دار وجود ندارد. امینی و همکاران (۱)، به منظور بررسی جذب آلودگی اقلایی در شهر اصفهان تحقیقی انجام دادند و بین میزان جذب آلودگی در شهریور و خرداد ماه اختلاف معنی دار گزارش نکردند ولی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که، برای تفکیک مناطق از نظر درجه آلودگی، جمع آوری برگ‌ها در انتهای فصل رویش نتایج بهتری خواهد داشت. با توجه به اینکه جذب عناصر در گیاهان پدیده فعلی فیزیولوژیک است، لذا در ماههای گرم سال با افزایش دما و تنفس، میزان جذب افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل شرایط جوی از جمله کاهش وزش باد و بارندگی طی فصل گرم، میزان جذب از طریق گیاه در تابستان بیشتر از بهار است (۲).

منابع مورد استفاده

۱. امینی، ح. ۱۳۸۸. ارزیابی تعدادی از گونه‌های درختی از نظر زیست ریدیابی فلزات سنگین و شاخص تحمل آلودگی. نشریه علوم خاک (۱۲): ۲۳-۲۸.
۲. پورخیاز، ع. ر.، ز. شیروانی و م. ق. قادری. ۱۳۹۳. زیست ریدیابی آلودگی هوای مناطق شهری با استفاده از گونه‌های چنار و زبان‌گنجشک (مطالعه موردنی شیراز). مجله محیط‌شناسی (۴۱): ۳۵۱-۳۶۰.
۳. داوری، ع.، ا. دانه‌کار، ن. خراسانی و آ. جوانشیر. ۱۳۸۹. بررسی تجمع فلزات سنگین در برگ، ریشه و رسوب درختان حرا در استان بوشهر. نشریه محیط‌زیست طبیعی (۳): ۲۷۷-۲۶۷.
۴. رشیدی، ف.، ع. جلیلی، س. بابایی و خ. ثاقب طالبی. ۱۳۸۹. واکنش آناتومی برگ زبان‌گنجشک در برابر گازهای آلینده. مجله جنگل ایران (۲): ۱۴۳-۱۳۳.
۵. شریعت، آ.، م. عصاره و ع. قمری زارع. ۱۳۸۹. اثر کادمیم بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژی *Eucalyptus occidentalis*. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (۱۴): ۱۵۳-۱۴۵.
- ۶- شعبانیان، ن.، و ج. چراغی. ۱۳۹۲. مقایسه زیست پالایی فلزات سنگین توسط گونه‌های چوبی مورد استفاده در جنگلداری شهری سنتدج. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (۲۱): ۱۶۵-۱۵۴.
۷. شهابی، ر.، د. هاشم‌آبادی و م. عطا‌آبادی. ۱۳۹۱. جمع‌آوری آلودگی‌های اتمسفری و فلزات سنگین توسط گیاهان زیستی شهر اصفهان. نشریه گیاهان زیستی و باغبانی (۲): ۲۶۳-۲۵۷.
۸. عبادی، م. ج. و ن. هنرجو. (مترجم). ۱۳۸۲. مرجع عناصر کمیاب (جزئی). کتاب مرجع. جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد، ۲۳۶ ص.
۹. عطا‌آبادی، م.، م. هودجی و پ. نجفی. ۱۳۸۹. زیست ریدیابی فلزات سنگین به‌وسیله گیاهان رویش یافته در منطقه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان. مجله محیط‌شناسی (۳۵): ۹۲-۸۳.
۱۰. عظیمپور، ث.، ب. پیله‌ور، ا. شیروانی، و. بایرامزاده و م. احمدی. ۱۳۹۲. گیاه پالایی سه گونه درختی زبان‌گنجشک، نارون‌چتری و بید سفید (*Fraxinus rotundifolia*, *Ulmus densa*, *Salix alba*) (مطالعه موردنی: پالایشگاه نفت کرمانشاه). مجله جنگل ایران (۲۵): ۱۵۰-۱۴۱.
۱۱. مظفریان، و. ۱۳۸۳. درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات فرهنگ معاصر چاپ سوم تهران، ۹۹۱ ص.
۱۲. نصرالله‌ی، ز. و م. غفاری. ۱۳۸۹. آلودگی هوا و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (۱۰): ۹۵-۷۵.
۱۳. ورامش، س.، م. حسینی و ن. عبدی. ۱۳۹۰. برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری. مجله محیط‌شناسی (۳۷): ۱۲۰-۱۱۳.
14. Campos, V. M., I. Merino, R. Casado, L. F. Pacios and L. Gomez. 2008. Phytoremediation of organic pollution: A review. *Spanish Agriculture Research* 6: 38-47.
15. Celik, A. and A. Aslihan. 2004. Determining the heavy metal pollution in Denizli (Turkey) by using *Robinia pseudo acacia* L. *Environment International* 31(1): 105-112.
16. Chapman, H. D. and P. F. Pratt. 1962. Methods of analysis for soil, plants and waters. *Soil Sciences* 93(1): 68-75.
17. Convile, R. N., E. J. Hutchinson, J. S. Mindell and R. F. Warren. 2001. The transport sector as a source of air pollution. *Atmospheric Environment* 35: 1537-1565.
18. Harrison, R. M. and M. B. Chirawi. 2004. The assessment of air and soil as contributors of some trace metals to vegetable plants. Use of a filtered air growth cabinet. *Science of the Total Environment* 383: 13-34.
19. Kabata -Pendias, A. and H. Pendias. 1992. Trace Element in Soil and Plants. Boca Raton Florida CRC, 365 p.
20. Kaya, G., N. Okumus and M. Yaman. 2010. Lead, Cadmium and Copper concentration in leaves of *Nerium*

- oleander* L. and *Robinia pseudoacacia* L. as biomonitor of atmospheric pollution. *Fresenius Environmental Bulletin* 19(4a): 98-103.
21. Khattak, M. and R. Jabeen. 2012. Detection of heavy metals in leaves of *Melia azedarch* and *Eucalyptus citriodora* as biomonitoring tools in the region of Quetta Valley. *Pakistan Journal of Botany* 44: 675-681.
22. Korori, S., H. Valipour, S. Shabestani, A. Shirvany and M. Matinizadeh. 2010. A 25-year monitoring of air pollution accomplished by plane tree species in Tehran. *International Journal of Environmental and Ecological Engineering* 4(9): 401-404.
23. Kurteva, M. K. 2009. Comparative study on *Plantago major* and *P. lanceolata* as bioindicator of the pollution. *Phytologia Balkanica* 15: 261-271.
24. Lawal, A. O., S. M. Batagarawa and O. D. Oyeyinka. 2011. Estimation of heavy metals in neem tree leaves along high way in kastina state of Nigeria. *Environmental Management* 15(2): 327-330.
25. Lewandowski, I., U. Schmidat and A. londo. 2005. The economic value of the phytoremediation function by the example of cadmium remediation by willow (*Salix* spp). *Agricultural system* 89: 68-89.
26. Monaci, F., F. Moni, E. Lanciotti, D. Grechi and R. Bargagli. 2000. Biomonitoring of airborne metals in urban environments: New trace of emission in place of lead. *Environmental Pollution* 107: 321- 327.
27. Pascal, M., M. Corso, O. Chanel, C. Badaloni, S. Henschei, K. Meister, D. Haluza and S. Medina. 2013. Assessing the public health impacts of urban air pollution in 25 European cities. *Science of the total Environmental* 44: 390-400.
28. Petron, T. S. 2011. Biomonitoring study of air pollution with *Betula pendula* from Plovdiv. Bulgaria. *Ecologia Balkanica* 3: 1-10.
29. Piczak, K., A. Lesniewic and W. Zyrnicki. 2003. Metal concentration in deciduous tree leaves from urban Arasin Poland. *Environmental monitoring and assessment* 86: 273-287.
30. Rai, R., M. Rajput and M. Agrawal. 2011. Gaseous air pollution. *Scientific Research Banaras Hindu University* 55: 77-102.
31. Ravikumar, M., P. Sarita, G. J. Naga Raju and S. Bhuloka Reddy. 2013. Trace element accumulation the leaves of (*Azadirachta indica*) and (*Pongamia glabra*) collected from different. *Environmental sites Environmental research and Development* 3: 1209-1215.
32. Sawidis, T. and P. Krystalidis. 2012. A study of air pollution with heavy metals in Athens city and Attica basin using evergreen trees as biological indicator. *Biologic Trace Element* 148: 396- 408.
33. Sridhar Susarla, A. and S. McCutcheon. 1998. Phytoremediation. An ecological solution to organic chemical contamination. *Ecological Engineering* 18: 647-658.
34. Tzvectova, N. and D. Kolarov. 1996. Effect of air pollution on carbohydrate and nutrient concentrations in some deciduous tree species. *Plant Physiology* 22: 53-63.